foliolis terminalibus rotundatis 1–2.5 cm longis 1–3 cm latis utrinque obtuse crenatis. Folia caulina inferiora et mediana laxa longe petiolata unifoliolata vel 2–3-foliolata tenuia supra viridia subtus viridescentia, petiolis gracilibus ca. 2–6 (−8) cm longis, foliolis terminalibus petiolulatis rotundatis raro reniformibus 2–4 cm longis 2.5–5 cm latis utrinque 6–8-rotundato-crenatis basi cordatis vel truncatis, foliolis lateralibus minoribus oblongis vel oblique ovatis integris vel saepe utrinque 1–2-crenatis 0.5–2 cm longis 0.1–1.5 cm latis; folia superiora minora breviter petiolata unifoliolata rotundata vel obovata 1–2 cm longa 1.5–2.5 cm lata utrinque lacere 2–4-dentata saepe duplicato-crenata. Racemi terminales rarius axillares vulgo 10–20 (−30)-flori in fructu elongati laxi 5–10 (−20) cm longi. Pedicelli graciles 7–10 mm longi erecto-patentes in fructu elongati 15–20 mm longi. Sepala oblonga ca. 2.5 mm longa 1.2 mm lata albo-marginata. Petala cuneato-obovata alba 6–7 mm longa 3–3.5 mm lata. Stamina 4–5 mm longa, antheris ca. 1 mm longis. Ovaria linearia ca. 3.5 mm longa. Siliquae vix incrassatae 4–5 mm longae ca. 0.7 mm latae. Semina minima sterilia. Fl. V–VI.

Nom. Jap. Tsuru-wasabi (nom. nov.)

Hab. in Japonia: Pref. Akita: monte Tashiro-dake (leg. R. Mochizuki, 15 Jun. 1968; 17 Mai. 1969; 8 Jun. 1969—typus, in Herb. Fac. Sci. Univ, Kanazawa).

* * * *

付記 本論文の著者も言及しているように，ツルワサビは *Cardamine*×*Wasabia* のように見受けられる。花後の茎が倒伏して上部葉腋から発根，発芽する性質は，秋田県ならミツバタネツケバナ *C. Fauriei* Franch.(=*C. geifolia* Koidz.) を想わせる。また根茎がやゝ肥厚すること，単小葉の葉が多いことゝ小葉の形などの諸点はユリワサビを想わせる。種子が不稔であり，外部形態が両者の中間的であることから，ミツバタネツケバナ（エゾワサビ）とユリワサビとの自然雑種と考定することが出来よう。人工交雑をして確認するのが本道であろうが，それをせずとも，ツルワサビの葯の発育度や花粉粒の異常度などを調べることで，自然雑種の可能性を更に支持する結果を得るかもしれない。或はオオバタネツケバナ×ユリワサビかもしれない。（編集委員 水島記）

正 誤 (Errata)

頁 (Page)	行 (Line)	誤 (For)	正 (Read)
288	19	正美	正義